

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

- Elma:** Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde;
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)
 2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
 4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün ara ile uygulanır.

- Armut:**
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)
 2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
 4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün ara ile uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: SORELLA® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D₁:9 ve C₃:11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SORELLA®'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D₁:9 ve C₃:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alüminyum içeren ürünler ile karıştırılmaz. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışımı denemelerinin yapılması tavsiye edilir



FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SORELLA®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	D ₁ :9	C ₃ :11	Fungisit (Mantar ilacı)

310 g/L Pyrimethanil + 95 g/L Trifloxystrobin

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajlarında kapalı olarak, çocukların ulaşamayacağı serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
- Uygulama esnasında genel korunma tedbirlerine mutlaka uyunuz.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmavınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NIĞDE
Tel: 0388 999 16 06
Fax: 0388 315 00 8922



Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. No:6 Bor/NIĞDE
Tel: 0388 999 16 06
Fax: 0388 315 00 8922
Müşteri Hizmetleri: 0388 315 00 8922
E-Posta: info@ferbis.com.tr

03 Ekim 2023
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı