

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile Ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi: ( " )  
Şarj No: (Damga ile)  
Ruhsat tarih ve no.su:



FERBİS TARIM TİCARET  
VE SANAYİ A.Ş.

Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

Ek-2

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
DOMATES (Tarla ve sera)	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	12 g/da (larva)- tarla 12 g/100 l su (larva)- sera	1 gün
BİBER (Tarla ve sera)	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	12 g/da (larva)- tarla 12 g/100 l su (larva)- sera	1 gün
DOMATES (Sera)	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	12 g/100 l su (larva)	1 gün
DOMATES (Sera)	Domates güvesi ( <i>Tuta absoluta</i> )	10 g/100 l su (larva)	1 gün
BİBER (Sera)	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	12 g/100 l su (larva)	1 gün
HIYAR (Tarla ve sera)	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	12 g/da (larva)- tarla 12 g/100 l su (larva)- sera	1 gün
KORNIŞON (Tarla ve sera)	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	12 g/da (larva)- tarla 12 g/100 l su (larva)- sera	1 gün
PATLICAN (Sera)	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	12 g/100 l su	1 gün
PATLICAN (Tarla)	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	12 g/da	1 gün

**PLOW® 35 WG**

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grup	28	İnsektisit (Böcek ilacı)

**%35 Chlorantraniliprole**

Önce etiketi okuyunuz.  
Evde kullanmayınız.  
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.  
Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız  
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya insan ve hayvanların tekrar girişi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. İlaç kuruduktan hemen sonra uygulama yapılan alana girilebilir.  
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**  
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:**

**Göz:** Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse Doktora başvurulmalıdır.  
**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse Doktora başvurulmalıdır.  
**Yutma:** hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey verilmeyin ve kusturmaya çalışmayın.  
**Solunum:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Rahatsızlık devam ederse Derhal doktora başvurulmalıdır.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

© FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

**İÇİNDEKİLER:**  
Chlorantraniliprole

**ZARARLILIK İŞARETLERİ:**



**D İ K K A T**

**ZARARLILIK İFADELERİ (H):**  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ (P):**  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Ürünü çiçeklenme zamanında kullanmayınız. İlaçlama bal arılarının aktif olmadığı zaman yapılmalıdır.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sulara bulaştırmayınız.
- İpek böceklerine etkisi olduğu için ilaçlama anında ilacın rüzgarla yakındaki dut ağaçlarına taşınmasına engel olunuz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kullanmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:**


Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

13 Eylül 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



FERBİS TARIM  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Organize San. Böl. No: 28 Nolu Yol Cd.  
No: 6 Bor/ NİĞDE Tel: 0388 375 00 79  
Niğde V.D. 3880830262 Tic. Sic. No: 2697

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Domates, Biber ve Patlıcan: Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*):** Alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta veya larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunursa derhal mücadeleye geçilir. **PLOW 35 WG** ile en iyi etki için yumurtaların bırakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır.

**Domates, Biber, Hıyar, Kornişon ve Patlıcan: Pamuk yaprakkurdu (*Spodoptera littoralis*):** Uygulama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan uygulama yapılmalıdır.

**Domates (sera) Domates güvesine karşı** ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3'ü zararının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Sezon içinde aynı yerde domates, biber, hıyar ve patlıcanda 2' den fazla **PLOW 35 WG** uygulaması yapmayınız.

**PLOW 35 WG** Fide için bitki yetiştirilen yerlerde kullanılmamalıdır.

**PLOW 35 WG** ilaçlamanın ardından bitki üzerinde ilaç kurumasından 1-2 saat sonra yağın yağışlardan etkilenmez. İlaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** **PLOW 35 WG** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PLOW 35 WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekranması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



**FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

## PLOW® 35 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grup	28	Insektisit (Böcek ilacı)
------	----	--------------------------

**%35 Chlorantraniliprole**

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.  
No:6 Bor/NİĞDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 315 00 89

### ÜRETİCİ FİRMA:

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**  
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1  
41400 Gebze / KOCAELİ  
Tel: 0262 751 14 12  
Fax: 0262 751 14 22



**FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
Organize San. Böl. Mah. 2B Nolu Yol Cd.  
No:6 Bor/ NİĞDE Tel:0388 315 00 79  
Niğde V.D: 3880830262 Tic.Sic.No:2697

13 Eylül 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

