

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat tarih ve Numarası:

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır*	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan Elması (<i>Datura stramonium</i>)	300 ml/da	Çıkış öncesi, mısır ekildikten sonra, yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır.
	Sürünücü Horozibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	250 ml/da	Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve yabancı otların 0-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.
	Şeytan Elması (<i>Datura stramonium</i>)	300 ml/da	Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve yabancı otların 0-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.

*Şeker ve Cın mısırında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

Debara kullanılacak su miktarı 20- 40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TACNA-P®

Süspo-Emülsiyon (SE)

Grup	C1 K1	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
------	-------	-----------------------------

270 g/l Terbuthylazine ve 64 g/l Pendimethalin

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Yutma: derhal tıbbi yardım sağlayınız. İlacın mideden tahliyesine doktor karar vermelidir. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey verilmez. Ve kusturulmaz.

Solunum: etkilenen kişi Temiz havaya taşınmalıdır. Solunumda güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

© FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A. Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

11 Nisan 2022

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Terbuthylazine
Pendimethalin

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H373 uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P260 Tozunu/dumanını/ gazını/sisini/ buharını/ spreyini solumayınız.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Orman ve Tarım Bakanlığı, 28 Nolu Yol 2.d.
No:6 Bor/ NİĞDE TEL:0388 315 00 79
Niğde V.D. 3880830262 Tic.Sic.No:2697



8 N.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Gece don tehlikesi altında olan tarlalarda ve çiğ ya da ıslak koşullarda kullanılmamalıdır. Don ya da aşırı ıslaklıktan dolayı zayıflamış, zarar görmüş ya da seyrek alanlarda ve bitki stres altında olduğu dönemlerde uygulamadan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında toprağın nemli olduğundan emin olunuz. Uygulamadan sonra uzun süre kuru hava şartları bitki koruma ürününün etkinliğinin azalmasına sebep olabilir. Aşırı taşlı ve çakıllı topraklara uygulamayınız. Su birikmiş veya su birikmesine meyilli tarlalarda uygulamayınız. Uygulamadan sonra toprak işlemesi yapmayınız. Organik madde oranı %10'nun üstünde olan topraklarda uygulamayınız.

Ekim ve çıkış öncesi herbisitlerinin nemli toprağa uygulanması ya da uygulamadan sonra yağmurla ya da sulamayla aktive edilmesi gereklidir.

MÜNAVEBE BITKİLERİ:

Herhangi bir nedenle ilaçlanan tarla bozulduğunda; toprak 15 cm işlenerek buğday, arpa, pamuk, patates, fasulye, soya, bezelye, mısır, yerbıstığı ve şaşırtılan bitkiler ekilebilir. Diğer bitkiler için 5 ay beklenmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TACNA-P® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 olarak sınıflandırılmış bir Herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek TACNA-P®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 ve Grup K1 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

TACNA-P®'nin diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.



FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TACNA-P®

Süspo-Emülsiyon (SE)

Grup	C1 K1	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
------	-------	-----------------------------

270 g/l Terbutylazine ve 64 g/l Pendimethalin

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.

No:6 Bor/NİĞDE

Tel: 0388 999 16 06 Fax: 0388 315 00 8922

ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze OSB Mahallesi 700.Sok.

No:711/1 41400 Gebze/KOCAELİ

Tel: (0 262) 751 14 12 (7 hat)

Fax: (0 262) 751 14 22



**FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**
Organize San. Böl. Mh. 2 B Nolu Yol Cd.
No:6 Bor/ NİĞDE Tel:0388 315 00 79
Niğde V.D. 3880830262 Tic.Sic.No:2697



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

11 Nisan 2022