

1 Tarih: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
kullanma tarihi: (")
No: (Damga ile)
runsat tarih ve no.su: 04.07.2022 / 12595

KULLANILACAKI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Şekerpancarı	Şekerpancar yaprak lekesi (<i>Cercospora beticola</i>)	25 ml/da	56 gün
Buğday	Pas hastalıkları (<i>Puccinia striiformis</i>) Kahverengi pas (<i>Puccinia recondita tritici</i>) Kara pas (<i>Puccinia graminis tritici</i>)	50 ml/da	56 gün

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karşıtmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SEDNA® 250 SC

Süspansiyon Konsantré (SC)

Grup	G1:3	Fungisit (Mantar İlacı)
		250 g/L Flutriafol

Önce etiketi okuyunuz.

Evide kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİMLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız.

Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı görülebilir. Özel bir etki şekli yoktur. Genelde merkezi sinir sistemini etkiler.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Yutma: Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım sağlayın. Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilemez ve kusturulmaz.

Solunum: Etiklenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmasına özen göstererek mideyi yıkayınız. Sonra simptomatik tedavi uygulayınız.

® FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Flutriafol

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlidir.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmemesinden kaçın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P501 İlgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



TARIM VE ÇEVRE BAKANLIĞI
GIDA VE KENTİRCİLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL... İZMİR
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

11 KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**erpancarı yaprak lekesi:**

ilaçlamalara hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görümez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Buğdayda pas hastalıkları (Sarı pas, kahverengi pas, kara pas):

Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi 20 gün arayla dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Sedna 250 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Sedna 250 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulamaya sayısını asmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.**KARISABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.



FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SEDNA® 250 SC

Süspansiyon Konsantré (SC)

Grup	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)
------	------	-------------------------

250 g/L Flutriafol

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Uygulama sırasında sentetik lastik eldiven giyiniz.
- Ürünü ambalajlarında kapalı olarak, çocukların erişemeyeceği ve gıdalardan uzak bir yerde kilit altında, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi: 2 B Nolu Yol
Cad. No:6 Bor/NIĞDE
Tel: 0388 999 16 06
Fax: 0388 315 00 8922



FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize San. Böl. Mh. 2B Nolu Yol
No:6 Bor/ NIĞDE Tel:0388 315 00 79
Niğde V.D. 3880830762 Tlc.Sic. No:2697

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN

Daire Başkanı



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

03 Haziran 2023