

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 g/100 L su larva, nimf, ergin	21 gün
	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 g/100 L su larva, nimf, ergin	
Domates (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 g/100 L su nimf, ergin	3 gün
	Pas akarı (<i>Aculops lycopersici</i>)	75 g/100 L su larva, ergin	
Biber (sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 g/100 L su larva, nimf, ergin	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada Avrupa kırmızıörümceği ve iki noktalı kırmızıörümceğe karşı mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 canlı birey görüldüğünde uygulama yapılır.

Domateste tütün beyazsineğine karşı genel olarak 5 dekarlık alan bir ünite olarak kabul edilir. Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.

Domateste pas akarına karşı bitkilerin özellikle toprağa yakın kısımları incelenerek, pas rengini alan bitkilerden yaprak örnekleri alınır. Yapraklar stereo binoküler mikroskop altında incelenerek zararlı aranır. Zararlılığın görüldüğü bitkiler ve çevresinde lokal uygulama yapılır. İki ve üç gün aralıklarla bitkiler incelenir ve yayılma olması halinde tüm alana bitki koruma ürünü uygulanır.



FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ALNURFO® 20 WP

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	21A	İnsektisit-Akarisit (Böcek ve Kırmızı örümcek ilacı)
-------	-----	---

%20 Pyridaben

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İshal, düşük tansiyon, kalp atışları ve solunumda düzensizlik görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.

Cilt ile teması halinde: Temas halinde bulaşık elbiselerini çıkarın. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Tahriş ve hassasiyet durumunda doktora başvurun.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Yutulması durumunda kusturmaya çalışmayın. Ağzı çalkalayın bol su içirin. Derhal doktora başvurun. Ürün etiket veya ambalajı doktora götürülür. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

11 Nisan 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

N. Arınç
Dr. Nesrin ÇAKIR ARINÇ
Genel Müdür

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Pyridaben

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

Organize Sanayi Bol. Mah. 28 Nolu Yol Cad. No: 6
Bor / NİĞDE / TÜRKİYE Tel: 0 388 999 16 06
Fax: 0 388 999 17 06 Mide Ve: 0388 999 0262
Mersis No: 0388083026200001 Tic.Sic.No: 2697

SİNEM BURCU POLAT
ÜRÜN MÜDÜRÜ

Biberde iki noktali kırmızı örümceğe karşı yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ALNURFO® 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sınıflandırılmış bir insektisit-akarisit. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ALNURFO® 20 WP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile ön karışım testi yapılmadan kullanılmamalıdır.



FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ALNURFO® 20 WP

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	21A	Insektisit-Akarisit (Böcek ve Kırmızı örümcek ilacı)
-------	-----	---

%20 Pyridaben

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol
Cad.

No:6 Bor/NIĞDE

Tel: (0 388) 999 16 06

Fax: (0 388) 315 00 89



Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Böl. Mah. 2B Nolu Yol Cad. No:6
Bor / NIĞDE / TÜRKİYE Tel: 0 388 999 16 06
Fax: 0 388 999 16 06 Mersis No: 08300030262
Mersis No: 0830083026200001 Tic.Sic.No: 2697

SİNEM BURCU POLAT
ÜRÜN MÜDÜRÜ

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Denetim Başkanı

11 Nisan 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.