İmal Tarihi: (Baski veya damga ile ay ve yil olarak)
Son kullanma tarihi. (")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no:

Net Miktari (kg veya lt)
Brüt agirlik (kg)
Azami perakende satis fiyati: Baski

Ek-2

KULLANILDIGI BITKILER VE KONTROL ETTIGI YABANCI OTLAR

Bitki Adi	Zararli Organizma Adi	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasindaki Süre
MISIR	Domuz pitragi *(Xanthium strumarium)* Horoz ibigi *(Amaranthus albus)* Köpek üzümü *(Solanum nigrum)* Sirken *(Chenopodium album)*	**500 ml/da** (Çikis öncesi)	56 gün
AYÇIÇEGI	Kirmizi köklü tilki kuyrugu *(Amaranthus retroflexus)* Sirken *(Chenopodium album)* Darican *(Echinochloa crus-galli)* Kara pazi *(Atriplex spp.)*	**400 ml/da** (Çikis öncesi)	---

***Süs (Hint) Misirinda kullanilmaz.**

ETKI SEKLI VE ÖZELLIKLERI: FERDOCK 500 SC, Misir, Ayçiçegi tarlalarinda birçok tek yillik genis ve dar yaprakli yabanci otlarin kontrolünde, çikis öncesi basariyla kullanilan sistemik bir yabanci ot ilacidir. Bilesimindeki Terbuthylazine aktif maddesiyle fotosentezi durdurur, diger etken madde S-metolachlor ise hücre bölünmesini durdurarak yabanci otlarin kontrolunu saglar. Yaprak, sürgün ve kökler vasitasiyla ksilem ve floem iletim demetleri araciligiyla süratle bitki içinde tasinir ve kisa sürede yabanci otlari kontrol altina alir. Tüm yabanci otlarin ölmesi ise 2 haftayi bulabilir. Iki etki mekanizmasina sahip olan Ferdock 500 SC, gerek ani etkisi gerekse topraktaki rezidüel etkisi sayesinde genis bir etki spektrumuna sahiptir.

BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayri bir kapta bir miktar su ile karistirilir. Uygulama makinesinin deposu yariya kadar su ile doldurulur. Makinenin karistiricisi çalisir durumdayken karisim depoya ilave edilir. Karistirmaya devam edilerek depo suyla tamamlanir. Uygulama tamamlanincaya kadar karistirma islemine devam edilir. Hazirlanan karisimi ayni gün içinde kullaniniz.

KALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapilmalidir. Uygulamalarda iyi bir kaplama saglayacak sekilde belirli bir alana verilecek karisim miktari ayarlanmalidir. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsiz veya az rüzgârli hava kosullarinda yapilmalidir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanin tamamlanmasindan hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir sekilde bosaltiniz. Depoya temiz su doldurduktan sonra karistiriciyi ve püskürtme sistemini çalistirarak tüm parçalarin yikanmasini saglayiniz. Yikama islemini su kaynaklarinin yakininda yapmayiniz. Yikama suyunu ve atiklari su kaynaklarina bosaltmayiniz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
15 Ocak 2024

Ferbis

FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S.

FERDOCK® 500 SC

Süspansiyon konsantre (SC)

Grup	K3/15	C1/5	HERBISIT (Yabanci ot ilaci)

312.5 g/L S-metolachlor + 187,5 g/L Terbuthylazine

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayiniz
Çocuklardan, gida ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanmasi sirasinda hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayiniz.
Bitki koruma ürünü uygulanmis sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayiniz.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildigi sekilde ve tavsiye edilen dozda kullaniniz.
TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DISINDA KULLANILMASI KESINLIKLE YASAKTIR.
Kullanilan ürünün bos ambalajlarinin içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayiniz. Çalkalama suyunu uygulama tankina boşaltiniz. Bu işlemi üç kez tekrarlayiniz.

ZEHIRLENME BELIRTILERI:
Bas agrisi, bas dönmesi, halsizlik, bulanik görme gibi genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Göze gelmesi halinde tahrise neden olabilir, deride hassasiyet yapabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERI:
Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açikken bol su veya göz solüsyonu ile yikayin.
Cilt: Temas halinde elbiselerini çikarin. Ilaç degen vücut kisimlarini 15–20 dakika bol su ve sabun ile yikayin. (Bakiniz önlem ifadeleri P333+P313.)
Yutma: Doktor veya zehir merkezini arayiniz. Hastayi kusturmaya çalismayin.
Soluma: Normal kullanim sartlarinda zararli etkisi yoktur. Uzun süre teneffüs edilmesi halinde hastayi ilaçli alandan uzaklastiriniz. Sicak ve dinlenme pozisyonunda tutunuz. Tibbi yardimda bulunun.

ANTIDOTU VE TEDAVISI:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanir.

® FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S. firmasinin tescilli markasidir.

UZEM (Ulusal Zehir Danisma Merkezi) Tel: 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkani

İÇİNDEKİLER:
S-metolachlor
Terbuthylazine

ZARARLILIK ISARETLERI:

DIKKAT

ZARARLILIK IFADELERI (H):
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol açar.
H373 Uzun süreli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalici, toksik etki.

ÖNLEM IFADELERI (P):
P260 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumayin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/göz Koruyucu/yüz koruyucu kullanin
P302+P352 DERI ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun ve su ile yikayin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçinin.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarina uyun.

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNIYET TEDBIRLERINI OKUYUNUZ

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bol. Mah. [illegible]
Bor / NİĞDE / T.[illegible]
Fax: 0.388 999 [illegible]
Mersis No: [illegible]
Sorumlu
Ruhsatlandirma Müd. No: 2891

BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKLI:

Misir: Ekim'i yapildiktan sonra; misir ve yabanci otlar çimlenip toprak yüzüne çikmadan önce (ekimden sonra en geç 5 gün içinde) toprak ilaçlamasi seklinde yapilir. Ilaçlama alçak tazyikli bir aletle yapilmali ve dekara 30-50 litre su kullanilmalidir.

Ayçiçegi: Önerilen dozdaki ilaçla hazirlanan karisim; keseksiz ve hafif nemli ayçiçegi tarlasina henüz çimlenme olmadan dekara 30-40 litre su ile düsük tazyikle atilmalidir.

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI: FERDOCK 500 SC isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasina göre Grup K3 ve C1 olarak siniflandirilmis bir herbisittir. Ayni etki mekanizmalarina sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamalari direnç gelisimini tesvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelisimini geciktirmek için, FERDOCK 500 SC yerine takibeden sezonda farkli etki mekanizmasina sahip (Grup K3 ve C1 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanilmasina özen gösteriniz. FERDOCK 500 SC, farkli etki mekanizmalarina sahip iki degisik aktif maddeyi içerdiginden direnç mukavemet programlarina güvenle alinabilirse de farkli etki mekanizmasina sahip ilaçlarla münavebeye alinmasi tercih edilmelidir.

KARISABILIRLIK DURUMU: Baska ilaçlarla karisim halinde kullanilmaz.

Ferbis

FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S.

FERDOCK® 500 SC

Süspansiyon konsantre (sc)

Grup	K3/15	C1/5	HERBISIT (Yabanci ot ilaci)

312.5 g/L S-metolachlor + 187,5 g/L Terbuthylazine

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

- Kalan ilaç mahlûlünü kuyu, havuz, çesme yalaklari ve akarsulara dökmeyiniz.
- Baliklara ve suda yasayan canlilara zehirlidir, sulara bulastirmaktan kaçininiz.
- Bos ilaç ambalajlarini baska bir gaye için kullanmayiniz, usulüne uygun olarak imha ediniz. - Bosalan gida ve içecek kutularina bitki koruma ürünü koymayiniz.
- Ilaçlama esnasında ilacın bitişikteki ürünlere sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- İlaçlı yerde hayvan otlatmayınız, ot almayınız.
-Arilara zehirlidir. Çiçeklenme zamani kullanmayiniz

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) sartlarda orijinal ambalajında açilmadan depolandiginda 2 yil süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hosgörü (tolerans) sinirlari disinda bir degisiklik olmaz.

FIRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarinda satilmak kaydi ile imalatçilar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETICIFIRMA:
FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NIGDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

YERLİ ÜRETİM

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

15 Ocak 2024

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bor
Bor / NİĞDE /
Fax: 0 388 99
Mersis No:
T. SELİN ERO
Ruhsatlandırma Sorumlusu