

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son Kullanma Tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj Numarası: (damga)
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

13148/26.04.2024

Ferbis

FERBİS TARIM TİCARETVE SANAYİ A.Ş

ŞAMAS®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu C2:7 G1:3 Fungisit (Mantar ilacı)

200 g/L Fluopyram + 200 g/L Tebuconazole

Önce etiketi okuyunuz.
Evdde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz
içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan
sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği
şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

**Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar
temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu
uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez
tekrarlayınız.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıken bol su ile yıkayın.
Gerekirse derhal doktora başvurun.

Cilt: Temas halinde elbiseleri çıkarın. İlaç değen vücut
kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Madde ile kirlenmiş elbise
ve ayakkabıları çıkarıp, tecrit edin. Ciltte küçük bulaşma olmuşsa
diğer kısımlara bulaşmasını engelleyin.

Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle
ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Tıbbi yardım sağlayın
ve ilaç ambalajını birlikte götürün.

Solonma: Temiz havaya çıkın. Solunum durmuş ise suni
teneffüs yaptırın. Solunum zorluğu var ise oksijen verin. Zehir
danışma merkezi veya doktoru arayın.

ANTİDÖTÜ: Özel bir antidötu yoktur. Belirtilere göre tedavi
uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR-DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

Net Miktar:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Fluopyram
Tebuconazole

ZARARLILIK İŞARETLERİ:**DİKKAT****ZARARLILIK İFADELERİ:**

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma
şüphesi var.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz
Koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P308+313 Maruz kalınma veya etkileşme
halinde **İSE:**

Tıbbi yardım/bakım alın.

P501 İçeriği /kabı ilgili yönetmelikler
doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik
riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun.

**KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı
kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su
kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için
kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha
ediniz.

Ferbis TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize San. Böl. Mah. 28 Nolu Yol Cad. No: 6
Bor / NIGDE / TÜRKİYE Tel: 0.388 999 16 06
Faks: 0.388 999 16 19 - Nigde V.D. 388 083 0262
Mersis No: 0-3880-8302-6200001 Tic Sic. No: 2697

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	35 ml / 100 L su	14 gün
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	35 ml / 100 L su	14 gün
	Armut memelipası (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)	35 ml / 100 L su	14 gün
Ayva	Ayva monilyası (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	35 ml / 100 L su	14 gün
Bağ*	Bağ küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	25 ml / 100 L su	14 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	25 ml / 100 L su	14 gün
Kiraz	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	25 ml / 100 L su	3 gün
	Kiraz meyve monilyası (<i>Sclerotinia fructigena</i>)	25 ml / 100 L su	3 gün
Şeftali	Şeftali küllemesi (<i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i>)	25 ml / 100 L su	3 gün
Domates (Sera)	Pathcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	30 ml / 100 L su	3 gün
Biber	Pathcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	30 ml / 100 L su	3 gün
Pathcan	Pathcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	30 ml / 100 L su	3 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	30 ml / 100 L su	3 gün
Kabak (Sera)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	30 ml / 100 L su	3 gün
Kavun Karpuz	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	30 ml / da	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

KABUL EDİLMİŞ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞ
26 Nisan 2024





FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ŞAMAS®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2:7	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	------	-------------------------

200 g/L Fluopyram + 200 g/L Tebuconazole

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM TESİSİ:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol
Cad. No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesine karşı;

- 1. Uygulama;** Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2. Uygulama;** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),
- 3. Uygulama;** Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
- 4. ve diğer uygulamalar** ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu görülürse 10-12 gün arayla uygulanmalıdır.

Armut karalekesine karşı:


- 1. Uygulama;** Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2 Uygulama;** Beyaz rozet döneminde
- 3 Uygulama;** Çiçek taç yaprakları %70- 80 dökülünce
- 4. ve diğer uygulamalar** 10 – 12 gün arayla uygulanmalıdır.

*Armutta karalekeye karşı ilaçlama yapıldığı takdirde memelipas için ayrıca ilaçlama yapmaya gerek yoktur.

Armut Memeli pasına karşı:

- 1. Uygulama;** Çiçek tomurcukları patlamak üzereyken
 - 2. Uygulama;** Beyaz rozet devresinde
 - 3 Uygulama;** Çiçek taç yapraklarının %80- 90'ı döküldüğü zaman
- Diğer Uygulama;** 3. Uygulamadan sonra havalarda yağışlı giderse haftada bir, yağışsız giderse 12- 13 günde bir yapılmalıdır. Genellikle 3 uygulama yeterli gelmekle beraber yağışlı geçen enfeksiyon periyotlarında 6 uygulama yapılmalıdır.

*Armutta karalekeye karşı ilaçlama yapıldığı takdirde memeli pası için ayrıca uygulama yapmaya gerek yoktur.





FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ŞAMAS®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2:7	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	------	-------------------------

200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM TESİSİ:
FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
 Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol
 Cad. No:6 Bor/NİĞDE
 Tel: (0 388) 999 16 06
 Fax: (0 388) 315 00 89

Ayva monilyasına karşı;

- a) Askospor uçuşlarının saptandığı yerlerde
1. Uygulama: Askospor uçuşu başladığında,
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan preparatın etki süresine göre doğada askospor uçuşu sona erinceye kadar yapılmalıdır.
 b) Askospor uçuş başlangıcının saptanamadığı yerlerde:
1. Uygulama: Çiçeklerin %5'i açtığında,
2. Uygulama: Çiçeklerin %50'si açtığında,
3. Uygulama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Bağ küllemesine karşı;

- 1. Uygulama:** bölgelere göre değişmekle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında,
2. Uygulama: çiçek taç yaprakları tamamen döküldüğünde ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu devrede,
3. ve diğer uygulamalar: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar 14 gün arayla yapılır.

Kayısıda monilyaya karşı;

- 1. Uygulama:** çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
2. Uygulama: tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Kirazda çiçek monilyasına karşı;

- 1. Uygulama:** çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
2. Uygulama: tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Kirazda meyve monilyasına karşı; meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftalide küllemeye karşı;

- 1. Uygulama:** Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk ilaçlama yapılmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesi ve iklim durumu dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 10 -14 gün arayla yapılmalıdır.

Domates (Sera), biber ve patlıcanda küllemeye karşı; ilaçlamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.



Ferbis TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
 Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. No: 6
 Bor / NİĞDE
 Tel: 0.388 999 16 06
 Faks: 0.388 315 00 89
 Mersis No: 0880-8302-6200001 Tic. Sic. No: 2697



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KABUL EDİLMİŞTİR

26 Nisan 2024

Hıyar (Sera), kabak (Sera), kavun ve karpuzda külemeye karşı; ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 7-10 gün arayla devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ŞAMAS® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 ve G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ŞAMAS®** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Elmada kara leke, bağ, şeftali ve sebzelerde küleme hastalıklarına karşı her ürün için bir sezonda üç defadan fazla ilaçlama yapmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 ve G1:3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden dayanıklılık oluşma riski düşüktür. Bununla birlikte aynı etmene karşı bir sezonda ardı ardına kullanımdan kaçınılmalı ve araya etki şekli farklı fungusitler kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ŞAMAS®

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	C2:7	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	------	-------------------------

200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM TESİSİ:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol

Cad. No:6 Bor/NİĞDE

Tel: (0 388) 999 16 06

Fax: (0 388) 315 00 89



Ferbis TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize San. Böl. Mah. 2B Nolu Yol, Cad. No: 6
Bor / NİĞDE / TÜRKİYE Tel: (0 388) 999 16 06
Faks: 0.388 999 16 06 NİĞDE 41 00 83 0262
Mersis No: 0-3880-8302-67050011000 Sic. No: 2697



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

26 Nisan 2024