

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)  
Şarj numarası: (damga)  
Ruhsat tarihi ve numarası: 15.03.2024 / 13063

#### KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Hastalık Organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bugday	Tahıl fide yanıklığı, kök ve kök bogazi çürüklüğü ( <i>Fusarium spp.</i> , <i>Bipolaris sorokiniana</i> )	200 ml/da	56 gün

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**  
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALIBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Bugdayda tahıl fide yanıklığı, kök ve kök çürüklüğüne karşı** hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ve bayrak yaprağı arasındaki dönemde yapılmalıdır

#### DİRENÇ YÖNETİMİ:

**PRONG®** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PRONG®**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1,3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.



FERBIS TARIM TİCARET  
VE SANAYİ A.Ş.

# PRONG®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	G1,3	G1,3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
	150 g/l Prochloraz + 42 g/l Prothioconazole		

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz,

içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİSİNDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bitki koruma ürününün yutulması halinde vücut hareketlerinde dengesizlik, mide bulantısı gibi belirtiler görülür. Taşınma veya uygulama sırasında fazla miktarda ürün deriye ve göze bulaşsa tahriş belirtileri ortaya çıkabilir.

#### İİK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

**Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekirse derhal doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecriit edin. Ciltte küçük bulaşma olmuşsa diğer kısımlara bulaşmasını engelleyin.

**Yutma:** Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Tıbbi yardım sağlayın ve ürün ambalajını birlikte götürün.

**Soluma:** Temiz havaya çıkın. Solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırın. Solunum zorluğu varsa oksijen verin. Zehir danışma merkezi veya doktoru arayın.

#### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

© FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

**ZEMEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114**

Net miktar:  
Azami perakende satış fiyatı:

#### İÇİNDEKİLER:

Prochloraz,  
Prothioconazole

#### ZARARLILIK İSARETLERİ:



DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar yol açar.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS

HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P273 Çevreye verilmesi kaçınılmalıdır.

P501 İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik Riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.  
Organize Sanayi Böl. 15.03.2024/13063  
Bor / NİĞDE / TÜRKİYE Tel: 0388 999 16 05  
Fax: 0.388 999 16 15  
Meris No: 038899916050001 Tic Sic No: 2697  
F. SELİM YILMAZ  
Ruhsatlandırma Sorumlusu

15 Mart 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.



Osman A. D. Başkan

**KARISABILIRLIK DURUMU:**

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



**FERBIS TARIM TİCARET  
VE SANAYİ A.Ş.**

# PRONG®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	G1,3	G1,3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	------	-------------------------

150 g/l Prochloraz + 42 g/l Prothioconazole

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Bahıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA VE İMALATÇI

### FİRMA:

**FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol  
Cad. No:6 Bor / NİGDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 999 16 19



**KULLANMADAN  
ÖNCE İYİCE  
ÇALKALAYINIZ**

15 Mart 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



**Ferbis** FERBIS TARIM TIC. VE SAN. A.Ş.  
Organize Sanayi Böl. Mah. 2 B Nolu Yol  
Bor / NİGDE / TÜRKİYE Tel: (0388) 999 16 06  
Fax: 0.388 999 16 19 www.ferbis.com.tr  
Mersis No: 08860822000001 Tic Sic No: 1807  
R. J. E. K. A. S.  
Ruhsatlandırma Sorumlusu