

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası:

Takimsan

TAKİMSAN TARIM KİMYA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Miktarı:

İÇİNDEKİLER:
Chlorantraniliprole

ESSUGO® 35 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	28	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

%35 Chlorantraniliprole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bu bitki koruma ürününün uygulandığı sahaya insan ve hayvanların tekrar girişi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bitki koruma ürünü kuruduktan hemen sonra uygulama yapılan alana girilebilir.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Deri ile teması halinde: Elbiseleri çıkarın. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Hastayı ve bitki koruma ürünü ambalajını derhal doktora gösteriniz. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

© TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
TESCİLLİ MARKASIDIR.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkanı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 g/da Larva	1 gün
Domates (sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 g/100 L su Larva	1 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/100 L su Larva	
	Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>)	10 g/100 L su Larva	
Biber (tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 g/da Larva	1 gün
Biber (sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 g/100 L su Larva	1 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/100 L su Larva	
Hıyar (tarla)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/da Larva	1 gün
Hıyar (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/100 L su Larva	1 gün
Kornişon (tarla)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/da Larva	1 gün
Kornişon (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/100 L su Larva	1 gün
Patlıcan (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/100 L su	1 gün
Patlıcan (tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 g/da	1 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca yada karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates, Biber ve Patlıcan: Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*): Alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta veya larva aranır. 100 bitkiden 5'1 buluşuk bulunursa derhal mücadeleye geçilir. **Essugo® 35 WG** ile en iyi etki için yumurtaların bırakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
Rev.0

20 Ekim 2023

TAKİMSAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Özgür KOYUNCU

Domates, Biber, Hıyar, Kornişon ve Patlıcan: Pamuk yaprakkurdu (*Spodoptera littoralis*);
Uygulama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğü takdirde yapılmalıdır.
Larvalar yaprak üzerine dağılımdan uygulama yapılmalıdır.

Domateste (sera) domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3'ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Sezon içerisinde aynı yerde domates, biber, hıyar, kornişon ve patlıcanda 2'den fazla **Essugo® 35 WG** uygulaması yapmayınız. Fide için bitki yetiştirilen yerlerde kullanılmamalıdır.

Essugo® 35 WG fide için bitki yetiştirilen yerlerde kullanılmamalıdır.

Essugo® 35 WG ilaçlamanın ardından, bitki üzerinde ilaç kurumasından 1-2 saat sonra yağın yağışlardan etkilenmez. İlaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ESSUGO® 35 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **ESSUGO® 35 WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir



**TAKİMSAN TARIM KİMYA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ESSUGO® 35 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	28	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

%35 Chlorantraniliprole

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sok. No:711/1
Gebze/KOCAELİ
Tel: (0262) 751 14 12
Fax: (0262) 751 37 30

ÜRETİCİ FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
41400 Gebze OSB Mahallesi
700. Sk. No: 711/1 Gebze/KOCAELİ
Tel: (0262) 751 14 12
Fax: (0262) 751 14 22



20 Ekim 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkanı V.

Özgür KOYUNCU