

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi. ("")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no.su: 04.02.2020/11573

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Hiyar (tarla)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	50 g/da	3 gün
Korrişon (tarla)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	50 g/da	3 gün
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 g/da	3 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 g/100 L su	3 gün
(tarla,sera)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	50 g/100 L su	3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce avrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaiken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

22 Aralık 2022

Ferbis

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CURATIO®

İstanbul Toz (WP)

Grup 27 Fungisit (Mantar ilacı)

%50 Cymoxanil

Önce etiketi okuyunuz.

Evede kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMAMI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik ve terleme.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açırken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerinizi çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Tahriş ve hassasiyet durumunda doktora başvurunuz.

Yutma: Yutulması durumunda bilinci açıkta hastayı kusturmanız. Derhal doktora başvurunuz. İlaç etiker veya ambalajı doktra götürünüz. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmmez ve kusturulmaz.

Solunma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunur zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Gerekliğinde belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

® FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının bescilli markasıdır.

Başkan V.

Net Miktar (kg veya lt)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Cymoxanil

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H361 fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğummuş çocukta hasara yol açma şüphesi var

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280 Koryucucu eldiven/koryucucu kıyafet/göz koryucucu/üz koryucucu kullanın.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P501 İçerdiği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Böl. Nilüfer / Bursa
Büy. / NİĞÖDE / TÜRKİYE / T.C. / M.Ç. / 16.06
Fax: 0 388 999 16 13 / M.Ç. / 16.06
Merkez No: 0388 999 16 13 / M.Ç. / 16.06
JINERBİS ÜRÜNLERİ

REV.1

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Hiyar, kornişon kabakgillerde mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bittikinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Kavunda Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bittikinin her tarafını, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates Mildiyö: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küi gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Curatio adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 27 olarak sınıflandırılmış bir fungisttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Curatio**'nun aynı üretim sezonunda önerilen toplam uygulama sayısını aşmamanız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CURATIO®

İslenabilir Toz (WP)

Grup	27	Fungisit (Mantar ilacı)
------	----	-------------------------

%50 Cymoxanil

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kullanmayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NIĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89



Ferbis FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Böl. Meh. 2B Nolu Yol, Niğde

Bor / NIĞDE / TÜRKİYE

Fax: 0 388 999 16 19

Tel: 0 388 999 16 06

Tic. Sic. No: 038803024901

Ünvanı: SİNEM ERGİLİ

Unvanı: ÜRÜN MÜDÜRÜ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GDİ ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

22 Ağustos 2022

