BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda mildiyö; İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm'ye ulaşınca başlanmalıdır. 2. ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılır.

Domateste mildiyö: Çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında, kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Hıyarda (Sera) mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkilerin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Marulda (Sera) Mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralıklarla fıdelerin şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürdürülmelidir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralıklarla devam edilmelidir. Uygulama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Yaprakların alt ve üstlerinin ürün ile iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması: 1. uygulama sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır. 2. uygulama havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Gövde enfeksiyonlarına karşı, enfekteli ağaçlardaki yaralar Ekim, Ocak ve Mart aylannda odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilmelidir.

Patateste mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Muzda Fusarium solguluğu hastalığı: İlaçlamaya, erken gelişim döneminde başlanılmalı ve preparatın kullanma talimatına göre 10 gün Aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Valunette® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U:33 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Valunette®'**nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U:33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Emülsiyon konsantre formülasyonlu bitki koruma ürünleri ile karışım yapılırken Valunette'yi eklemeden önce mutlaka ayn bir kap içerisinde önce emülsiyon konsantre formülasyonlu ürün eklenmeli ve üzerine bir miktar su ilave edilerek karıştırılmalıdır.

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön kanşım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

13 Aralık 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Ferbis FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VALUNETTE®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grup	U:33	*Fungisit (Mantar ilacı)*

400 g/L Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajlarını ağzı kapalı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- Tank karışımını tamamlamadan önce boş ilaç kaplarını en az üç kez bol suyla çalkalayınız ve çalkaladığınız suyu sprey karışıma ilave ediniz. Boş ilaç ambalajlarını yakmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Uygulama esnasında koruma uyarılarına mutlaka uyunuz.
- Uygulamadan sonra elbiselerinizi çıkarıp el, yüz ve vücudunuzu bol su ile yıkayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal depolama (serin ve kuru) şartları altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:
FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

YERLİ ÜRETİM

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN.
Organize Sanayi Bölgesi Mah.
Bor / NİĞDE / TÜRKİYE
Fax: 0 388 999 16 06
Mersis No: 0380003030000001 Tic. Sic. No: 2...
ŞELİN EROL
Ruhsatlandırma Sorumlusu

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi. (")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no.su: 07.08.2020/11679

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Bağ	Mildiyö (*Plasmopara viticola*)	400 ml/100 L su
Domates (Sera)	Mildiyö (*Phytopthora infestans*)	400 ml/100 L su
Domates (Tarla)	Mildiyö (*Phytopthora infestans*)	400 ml/da
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde mildiyö *(Pseudoperonospora cubensis)*	400 ml/100 L su
Marul (Sera)	Mildiyö *(Bremia lactucae)*	400 ml/100 L su
Turunçgiler	Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması *(Phytophthora citrophthora)*	1000 ml/100 L su
Patates	Mildiyö (*Phytopthora infestans*)	400 ml/100 L su
Muz (Sera)	Fusarium solgunluğu hastalığı *(Fusarium oxysporum f.sp. cubense)*	400 ml/100 L su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

13 Aralık 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Ferbis **FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

VALUNETTE®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grup	U:33	*Fungisit (Mantar ilacı)*

400 g/L Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ....gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın, doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürün.
Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
Yutma: Ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.
Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:
Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
ZARARLILIK İŞARETLERİ:

UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ (P):
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmeliğe göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Ruhsatlandırma Sorumlusu
ŞELİN EROL

Rev.1