

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 03.02.2020/11571

KULLANILACAGI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/da Larva	7 gün
	Yesilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)		
Biber (Tarla)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Domates (Sera)	Yesilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Domates (Tarla)	Yesilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Bag*	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	25 g/100 L su Larva	28 gün
	Bag tripsleri (<i>Rubiothrips vitis</i> , <i>Mycterothrips albicornis</i> , <i>Mycterothrips tschirkunae</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	50 g/100 l su Ergin-Larva (Üzüm ve Yaprak)	28 gün
Hiyar (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su Larva	14 gün
Kornison (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su Larva	14 gün
Patlıcan (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Pamuk	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	35 g/da Larva	21 gün
	Yesilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 g/da Larva	21 gün
Karanfil (Kesme karanfil)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g/100 L su Larva	-
	Yesilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)		
Zeytin	Zeytin fidantirtili (<i>Palpita unionalis</i>)	30 g/100 L su Larva	28 gün
Nar	Harnup güvesi (<i>Ectomyelois ceratoniae</i>)	30 g/100 L su Larva	28 gün
Armut	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	40 g/100 L su	21 gün
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	40 g/100 L su Larva	14 gün


FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.S.

EVANDER®

Suda Çözünebilir Granül (SG)

Grup	6	İnsektisit (Böcek ilacı)
------	---	--------------------------

%5 Emamectin benzoate

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

BITKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR SEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIS SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ SEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri, göz, burun ve boğazda tahris yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın.

Gerekirse doktora başvurun.

Cilt: Temas halinde bulasık elbiselerini çıkarın. Bitki koruma ürünü degen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Tahris ve hassasiyet durumunda doktora başvurun.

Yutma: Yutulması halinde bilinci açıksa hastayı kusturun. Derhal doktora başvurun. Ürün etiket ve ambalajını doktora götürün. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

Solunum: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmussa suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

® FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.S. firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

19 Ekim 2023


Umüt Uğur BAHÇE
Daire Başkanı

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:
Emamectin benzoate

ZARARLILIK İSARETLERİ:



DIKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlidir.

H319 Ciddi göz tahrisine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlidir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulandırmaktan kaçınınız.

Faydalılar uygulamadan 48 saat sonra salınmalıdır.

Bosalan ambalajları başka amaç için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.


Organize Sanayi Bölgesi
Borççuk Çiftliği
Etiler Mahallesi
Ruhşahmehmeti Sokakı No: 114
06510 Beştepe/Beştepe/Ankara

*Tüketim amaçlı bag hasadı yapılacak bag alanlarında kullanılmaz.



