

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son Kullanma Tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Satış Numarası : (damga)
Ruhusat Tarihi ve Numarası : 05.09.2022 -12493

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Sebzeye fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp</i>) <i>Rhizoctonia spp</i>	500 ml/da	14 gün
Biber (Sera)	Sebzeye fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp</i>)	500 ml/da	10 gün
Hiyar (Sera)	Sebzeye fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp</i> , <i>Rhizoctonia spp</i>)	500 ml/da	10 gün
Çiçek (Sera)	Çiçek kök çürüklüğü <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Fusarium spp</i> <i>Macrophomina phaseolina</i>	500 ml/100 L su	3 gün

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayırı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karışımaya işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirlenen alanlara verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

Ferbis FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SOLEA®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	E2:12	A1:4	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	------	-------------------------

12,5 g/L Fludioxonil + 5 g/L Metalaxyl

Önce etiketi okuyunuz.

Eyde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıdalarından ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4 üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri oluşabilir:

ILKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15- 20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Çiğir: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Yutma: Ağız bol suyla yıkamalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmeyez ve kusturulmaz.

Solunum: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yapılır. Doktora başvurulmalıdır.

İlet Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

ÇİNDEKİLER:

Fludioxonil
Metalaxyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



YARARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H412 Sıcak ortamda uzun süre kalırsa, zararlı etki.

İNLEM İFADELERİ:

H413 Çevreye verilmesinden kaçınm.

H410 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yağ koruyucu kullanın.

H501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

H414 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

11 Ocak 2023

Dr. Nesrin ÇAKIRARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Organik San. Bil. Mh. ZB Katı Bol. Cd.
No:100 / Niğde / T.C. DE Tel: 0388 312 00 79
Niğde Y.D. 38803026Z T.C. S.C. No: 2697

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Sebye fidelerinde - ekerden ve kök çürüklüğünde - (Domates, Biber, Hıyar) (Seraya):
Fideler seraya şaşırtıldıktan sonra, damlatma sulama sistemi ile dekara tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü sulama suyu ile birlikte toprağa verilir. Buna göre 1. uygulamaya fideler seraya şaşırtıldıktan sonra hemen yapılmalıdır. Uygulamalar gerekirse 15 gün aralıklarla devam ettirilmelidir.
Damlatma sulama sistemi olmayan seralarda, bitki köklerine düşecek bitki koruma su miktarı; dekara doz, dekara bitki koruma ürünü uygulanacak bitki sayısı ve her bitki dibine verilecek su miktarı hesaplanarak verilir.

Çilek kök çürüklüğü: Çilek fideleri seraya şaşırtıldıktan sonra, damlatma sulama sistemi ile tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü sulama suyu ile toprağa verilir. Buna göre 1. uygulamaya fideler seraya şaşırtıldıktan sonra hemen yapılmalıdır. 2. uygulamaya 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılır. Uygulamalar gerekirse 15 gün aralıklarla devam ettirilmelidir.

DIRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
SOLEA® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E2:12 ve A1:4 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, ilacın aynı üretim sezonunu içerisinde önerilen toplanım uygulama sayısını aşmıyoruz. Uygulamamızın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E2:12 ve A1:4 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞISABİLLİK DURUMU:

Alkahlı karakterde ola bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Ferbis FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SOLEA®

Süspansiyon Konsantré (SC)

Grubu	E2:12	A1:4	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	------	-------------------------

12,5 g/L Fludioxonil + 5 g/L Metalaxyl

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

@ FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hışgörü (tolerans) sınırları dışında bir değışiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tabiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Ozanize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.

Nr:6 Bor/NIĞDE

Tel: (0 388) 999 16 06

Fax: (0 388) 315 00 89

Fax: (0 388) 315 00 89



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

11 Ocak 2023

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı



FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
JRGATE SAN. BÖL. Mh. 2B Nolu Yol Cd.
No:6 Bor/NIĞDE Tel:0388 315 00 79
Niğde Kd. 3880030262 Tlc.Sic.No:2697