



**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKLI:**

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında tomurcukların açılmasından 3-4 hafta önce hava sıcaklığının +5°C'nin üzerinde olduğu günlerde bir kez ilaçlama uygulanır.

**Şeftalide şeftali virgül kabuklubitine karşı** nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra birinci uygulama ve ardına ilk uygulamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılmalıdır.

**Şeftalide dut kabuklubitine karşı** uygulamalara ilk larva çıkışında başlanır ve ürünün etki süresi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılır. Ancak ikinci dönemde, bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

**Zeytinde zeytin pamuklukosniline karşı** zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı** yumurtalı disiler kontrol edilerek ve yumurtaların %50'sinin açıldığı (ikinci dönem ergin oranının %70-80'i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

**Zeytinde zeytin karakosniline karşı** yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede birinci, %90'ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

**Zeytinde zeytin yarakosniline karşı** zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**Bagda turuncgöl unlubitine karşı** mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeyle başladığı ve unlubitin yeşil aksamına doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmussa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulasma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

**Turuncgölde turuncgöl kırmızı örümceğine karşı** 10 yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı, bu dönem geçirilmiş ise meyve bağladıktan bir hafta sonra yapılmalıdır.

**Turuncgölde pasböcüsüne karşı** Mayıs ayı başından itibaren 7-8 günde bir bahçenin değişik yerlerinden el lupu ile 100 meyvede yapılan sayımlarda bir görüs alanında (1-2 cm<sup>2</sup>) 1-2 adet pas böcüsü görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.



FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

**TIENDA®**  
**YAZLIK YAG**

Grup	-	Insektisit -Akarisit (Böcek ve KırmızıÖrümcek İlacı)
------	---	---

700 g/l Mineral yağ

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol  
Cad. No:6 Bor/NİGDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 315 00 89



Ferbis FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. No:6  
Bor / NİGDE / TÜRKİYE Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 315 00 89  
Mersis No: 080800226000591 Tic.Sic.No: 2697

Bayram KERİMOĞLU  
Dai Bek. J.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

19 Ocak 2024

