

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi :

Şarj Numarası :

Ruhsat Tarihi ve Numarası : 18.01.2024 / 12965

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAGI BITKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Uygulama zamanı
Buğday	Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) İtalyan çimi (<i>Lolium multiflorum</i>)	25 ml/da + 100 ml Vetro*	Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)
	Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kısa başlıklı kuş yemi (<i>Phalaris brachystachys</i>) Yumuşak başlıklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	30 ml/da + 100 ml Vetro*	

* Vetro (Na Lauryl ether sulphate) yayıcı-yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka MAIRA® ile birlikte kullanılmalıdır.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALIBRASYON:


Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

18 Ocak 2024



Ferbis

FERBIS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.

MAIRA®

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grup	B2	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
------	----	-----------------------------

30 g/l Mesosulfuron methyl +6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium + 90 g/l Mefenpyr diethyl (Safener)

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün bos ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına bosaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İshal, kusma, mide bulantısı gibi genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıken bol su veya göz solüsyonu ile yıkayın.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın.

Yutma: Doktor veya zehir merkezini arayınız. Hastayı kusturmaya çalışmayın.

Solunum: Normal kullanım şartlarında zararlı etkisi yoktur. Uzun süre teneffüs edilmesi halinde hastayı ilaçlı alandan uzaklaştırınız. Sıcak ve dinlenme pozisyonunda tutunuz. Tıbbi yardımda bulunun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

© FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı:

Brüt ağırlık:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Mesosulfuron methyl
Iodosulfuron-methyl-sodium
Mefenpyr diethyl

ZARARLILIK İSARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara az zehirlidir. Su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Arılara zararlıdır, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Komşu tarlalara direkt veya indirekt temasından kaçınınız.
- İlaçlamada kullanılan alet ve edavatı iyice yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleterek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlacın dökülmesi halinde üzerine talaş, kil, toprak dökünüz, sonra dikkatlice süpürüp toplayınız ve uygun bir yere gömünüz.

Ferbis FERBIS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Böl. Mecidiyeköy Cad. No:16
Bor / NİĞDE / TÜRKİYE Tel: 0 388 099 16 06
Fax: 0 388 099 16 19 Niğde V.D.: 388 063 0263
Merbis No: 038809902620001 Tic.Sic.No: 26037

 **Ferbis** FERBİS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.

MAİRA®

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grup	B2	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
------	----	-----------------------------

30 g/l Mesosulfuron methyl +6 g/l Iodosulfuron-methyl-
sodium + 90 g/l Mefenpyr diethyl (Safener)

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKLI:

İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm olmalıdır.

MAİRA® sistemik bir ilaç olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşırı yağışın nede olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.

Aynı yerde aynı herbisitün veya aynı etkiye sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hâkim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara hâkim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı herbisitlerin döngümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

İkinci ürün ekiminde dikkat edilecek hususlar:

- Pamuk ve soya emniyetle ekilebilir.
- Kuruya mısır ekilecekse tarlanın mutlaka derin sürülmesi gereklidir.
- Diğer ürünler için mutlaka firmaya danışınız.

Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar:

- **MAİRA®** kullanılan tarlalarda buğdaydan sonra mercimek ekilmemelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MAİRA® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **MAİRA®**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmasına gerek yoktur. Eğer bir karışıma gerek duyulur ise ön karışım testi yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
18 Ocak 2024



Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
Bor / NİĞDE / TÜRKİYE TEL: 0 388 999 16 06
Fax: 0 388 999 16 19 NİĞDE V.D. 388 033 17 02
Mersis No: 0888003026200001 Tic. Sic. No: 3607

Ruhsatlandırılmıştır