İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarasi:

BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR:

Bitki Adi	Zararli Organizma Adi	Uygulama Dozu ve Dönemi
Armut	Armut psillidi (*Cacopsylla pyri*)	1000 ml + 300 ml/100 L su 190 g/l malathion
Zeytin	Zeytin karakosnili (*Saissetia oleae*)	1250 ml/100 L su Akdeniz Bölgesinde kis ve yaz mücadelesi 1500 ml/100 L su Marmara ve Karadeniz Bölgesinde yaz ve kis mücadelesi 1500 ml/100 L su Ege Bölgesinde kis mücadelesi 1250 ml/100 L su Ege Bölgesinde yaz mücadelesi
	Zeytin yarakosnili (*Pollinia pollini*)	1200 ml/100 L su
	Zeytin pamuklukosnili (Philippia oleae)	1250 ml/100 L su
Bag *	Turunçgil unlubiti (*Planococcus citri*)	1000 ml/100 L su
Antepfistigi	Antepfistigi yesil psillidi (*Megagonoscena viridis*)	1500 ml/100 L su

*** Tüketim amaçli bag yapragi hasadi yapilacak bag alanlarinda kullanilmaz.**

BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayri bir kapta bir miktar su ile karistirilir. Ilaçlama makinesinin deposu yariya kadar su ile doldurulur. Makinenin karistiricisi çalisir durumdayken hazirlanan karisim depoya ilave edilir. Karistirmaya devam edilerek depo suyla tamamlanir. Uygulama tamamlanincaya kadar karistirma islemine devam edilir. Hazirlanan karisimi ayni gün içinde kullaniniz.

KALIBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapilmalidir. Uygulamalarda iyi bir kaplama saglayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsiz veya az rüzgarli hava kosullarinda yapilmalidir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanin tamamlanmasindan hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalistirarak tüm parçalarin yikanmasini saglayiniz. Yikama islemini su kaynaklarinin yakininda yapmayiniz. Yikama suyunu ve atiklari su kaynaklarina bosaltmayiniz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR
10 Ocak 2024

Ferbis

FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S.

NAPAE®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	-	İnsektisit + Akarisit (Böcek ve kirmiziörümcek ilaci)

850 g/l Mineral yag

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayiniz.
- Çocuklardan, gida ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanmasi sirasinda hiçbir sey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmis sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayiniz.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DISINDA KULLANILMASI KESINLIKLE YASAKTIR.

- Kullanilan ürünün bos ambalajlarinin içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayiniz. Çalkalama suyunu ilaçlama tankina bosaltiniz. Bu islemi 3 sefer tekrarlayiniz.

ZEHIRLENME BELIRTILERI:
Genel zehirlenme belirtileri görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Göz: Göz kapaklarini açik tutarak bol su ile yikayin. Kizariklik veya agri varsa doktora gidilmelidir.
Cilt: Bol su ve sabun ile iyice yikanmalidir. Kirlenen elbiseyi çikarip temas eden cilt yikanmalidir. Bitki koruma ürünü cilde temas etmisse 10 dakika soguk su ile agri devam ediyorsa daha uzun süre yikayin.
Soluma: Gaz solumasi sonucu burun ve bogazda tahris veya öksürük varsa etkilenen kisi temiz havaya tasinmalidir. Belirtiler devam ederse doktora götürülmelidir.
Yutma: Sadece agiz kirlenmisse su ile çalkalanmalidir. Bol miktarda yutulmasi durumunda zorla kusturulmadan doktora götürülmelidir.

ANTIDOTU VE TEDAVISI:
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanmalidir.

® FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S. firmasinin tescilli markasidir.

ÜZEM (Ulusal Zehir Danisma Merkezi) Tel: 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktari:
Azami Perakende Satis Fiyati:

Ek-1

İÇİNDEKİLER:
Mineral yag

ZARARLILIK ISARETLERI: -

ZARARLILIK IFADELERI (H):
Zararli olarak siniflandirilmamistir.

ÖNLEM IFADELERI (P):
P273 Çevreye verilmesinden kaçinin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanin.
P501 İçerigi/kabi ilgili yönetmelikler dogrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sagligina ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarina uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR:
- Arilara zehirlidir. Çiçeklenme zamani kullanmayiniz.
- Baliklara zehirlidir. Sulara bulastirmayiniz.
- Kükürtlü ilaçlarla bir arada veya kükürtlü ilaçlarin tatbikinden 3 hafta sonrasina kadar ilaçlama yapilmamalidir. Yüksek sicaklikta ve agaçlar solgun iken ilaçlama yapilamaz.
- Bitki koruma ürününü ambalajinda, kapali olarak tutunuz.
- Bosalan gida ve içecek kutularina bitki koruma ürünü koymayiniz.
- Bosalan ambalajlari baska maksatlar için kullanmayiniz ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) sartlarda orijinal ambalajinda açilmadan depolandiginda 4 yil süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hosgörü (tolerans) sinirlari disinda bir degisiklik olmaz.

FIRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarinda satilmak kaydi ile, imalatçilar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Imalatçilar ürünlerinin hatali depolanmasi veya hatali tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bol... Cad. No:6
Bor / NİĞDE
Fax: 0.388...
Mersis No: 0...
Ruhsatlandırma Sorumlusu

REV.1

BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKLI:

Armutta armut psillidine karsi kislayan döl erginlerinin biraktigi yumurtalarin hemen hemen tamamimin açilip ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye basladigi, sürgünlerin % 15'den fazlasinda bulasma görülmeye basladigi, tatlimsi madde akintisinin baslamadigi ve dogal düsmanlarin fazla bulunmadigi zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Zeytinde zeytin karakosniline karsi uygulama zamani aktif larva çikisina göre saptanir. Bu amaçla uygulama yapilacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayida agacin 4 yönünden 20-25 cm uzunlugundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yila ait yumurtali disiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çikisi saptanir. Yumurtalarin %50'sinin açildigi devrede birinci, % 90'inin açildigi devrede ise ikinci uygulama yapilir.

Zeytinde zeytin yarakosnili ve zeytin pamuklukosniline karsi zararli görüldügünde uygulama yapilir.

Bagda turunçgil unlubitine karsi mücadele iki dönemde yapilir. Birinci dönem asmanin gövdesindeki kabuklarda islaklik görülmeye basladigi ve turunçgil unlubitinin yesil aksama dogru ilerlemeye basladigi dönemdir. Bu dönem koruklar yaklasik nohut büyüklügünde olup yalniz turunçgil unlubitinin görüldügü asmalara uygulama yapilmalidir. Ikinci dönem turunçgil unlubitinin yaprak ve salkimlara geçtigi, tanelerin tatlanmaya basladigi dönemdir. Asmalarin çogunda bulasma saptanirsa ve ayrica ihraç edilen çesitlerde her iki dönemde de uygulama yapilabilir.

Antepfistigi yesil psillidine karsi zararlı görüldüğünde uygulama yapılır.

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:

Direnç gelisimini geciktirmek için **NAPAE®**'nin ayni üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayisini asmayiniz.

KARISABILIRLIK DURUMU:

Kükürtlü bitki koruma ürünleri ile karistirmayiniz. Uygulama için çok miktarda karisim yapmadan önce ön karisim denemelerinin yapilmasi tavsiye edilir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

10 Ocak 2024

Ferbis

FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S.

NAPAE®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	-	Insektisit + Akarisit (Böcek ve kirmiziörümcek ilaci)

850 g/l Mineral yag

T.C.
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:
FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

YERLİ ÜRETİM

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. No:6
Bor / NİĞDE
Fax: 0 388 315 00 89
Mersis No: 0316 0399 0000 0001
ŞÜKRÜ ŞELİN EROL
Ruhsatlandırma Sorumlusu