

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi. (")

Şarj No: (Damga ile)

Ruhsat tarih ve no.su: 29.07.1998/3459

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre	
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	150 g/ 100 L su	14 gün	
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	150 g/ 100 L su	14 gün	
Erik	Cep hastalığı (<i>Taphrina pruni</i>)	300 g/ 100 L su	14 gün	
Şeftali	Sert çekirdekli meyvelerde Çiçek monilyası (<i>Monilia laxa=Sclerotinia laxa</i>)	300 g/ 100 L su	14 gün	
Kiraz, Vişne	Sert çekirdekli meyvelerde Çiçek monilyası (<i>Monilia laxa=Sclerotinia laxa</i>)	300 g/ 100 L su	14 gün	
Şeftali, Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde Yaprak delen (Çil) (<i>Wilsonomyces carpophilus=Stigmia carpophila</i>)	300 g/ 100 L su	14 gün	
Turunçgiller	Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamlanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	300 g/ 100 L su (Meyve enfeksiyonları)	28 gün	
Yenidünya	Kara leke (<i>Venturia inaequalis var.eriobotryae</i>)	300 g/ 100 L su	14 gün	
Bağ**	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g/ 100 L su	28 gün	
	Ölüko* (<i>Phomopsis viticola</i>)	250 g/ 100 L su	28 gün	
Sebze fideleri***	Kök çürüklüğü (Çökerten) (<i>Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp. Phytophthora spp.</i>)	200-250 g/ 100 L su	28 gün	
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	100 L suya doz 300 g/ 100 L su	Dekara doz**** 150 g/da	14 gün
	Yaprak küfü (<i>Cladosporium fulvum</i>)	250 g/ 100 L su		14 gün
	Sebzelerde kuşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	250 g/100 L su		14 gün
Marul	Mildiyö (<i>Bremia lactucae</i>)	300 g/ 100 L su	28 gün	
Soğan	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	300 g/ 100 L su	28 gün	
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	350 g/ 100 L su	28 gün	

Ferbis

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TAKCAPTAN®

İslanabilir Toz (WP)

Grup	M4	Fungisit (Mantar ilacı)
------	----	-------------------------

% 50 Captan

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri, göz, burun ve boğazda tahriş yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurunuz.

Cilt: Temas halinde bulaşık elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Tahriş ve hassasiyet durumunda doktora başvurunuz.

Yutma: Yutulması durumunda bilinci açıksa hastayı kusturunuz. Derhal doktora başvurunuz. İlaç etiket veya ambalajı doktora götürülür. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

Solunum: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Toksisitesi düşük olup özel bir antidotu yoktur. Araza göre tedavi uygulanır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



Miktarı (kg veya lt)

Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Captan

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H331 Solunması halinde toksiktir.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE:

Tıbbi yardım/bakım alın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise:

Tıbbi yardım/müdahale alın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini

solumaktan kaçının.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda

bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Böl. Mah. 28 Nolu Cad. No:18
Bor / NIĞDE / TÜRKİYE Tel: 0388 939 06 06
Fax: 0388 939 15 19 Niğde V.D. No: 083 0262
Mersis No: 08380830262330001 Tic Sic No: 2697

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

29 Mayıs 2023

Eriklerde cep hastalığı:**1.uygulama:** Tomurcuklar kabardığı dönemde**2.uygulama:** Çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.**Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Şeftali, Kiraz, Vişne):****1.uygulama:** Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)**2.uygulama:** Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.**Şeftali yaprak deleni (Çil):****1.uygulama:** Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,**2.uygulama:** İlbaharda çiçek tomurukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),**Kayısıda yaprak deleni:****1.uygulama:** Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,**2.uygulama:** İlbaharda çiçek tomurukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),**3.uygulama:** Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.**Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması:**

* Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1.uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.**2.uygulama:** Havalarda yağışlı giderse 1.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde veya kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Yenidünya karalekesi:**1.uygulama:** Sonbaharda çiçek tomurukları kabarmadan önce,**2.uygulama:** Çiçek tomurukları açılmadan önce,**3.uygulama:** Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra**4.ve diğer uygulamalar:** 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, 10 gün arayla yapılmalıdır.**Bağ ölükol:**• **Yaz uygulaması:****1.uygulama** sürgünler 2-3 cm olduğunda,**2.uygulama** sürgünler 8-10 cm olduğunda,**3.uygulama** sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.**Bağ mildiyö:****1.uygulama:** sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.**2. ve sonraki uygulamalar:** 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.**Sebze fidelerinde kök çürüklüğü ve çökerten:** Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır.

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TAKCAPTAN®


İslanabilir Toz (WP)

Grup	M4	Fungisit (Mantar ilacı)
------	----	-------------------------

% 50 Captan

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
 Organize Sanayi Böl. Milli 2B No.lu Yol Çat. No:6
 Bor / MUĞLA / TÜRKİYE Tel: 0.388 999 16 05
 Fax: 0.388 999 16 19 Nigde V.Ç. 388 083 0277
 Mersis No: 08860030260000111111111111111111

FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
 Muhsatlandırma Şubesi



29 Mayıs 2023
 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KABUL EDİLMİŞTİR.

Domates mildiyö: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates yaprak küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala ilaçlama kesilmelidir.

Marul mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı, birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir. Fidelikte ilaçlama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.

Soğan mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara uygulama tekrarlanır.

Karanfil pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce uygulamaya başlanmalı ve 10'ar gün ara ile uygulamalar yapılmalıdır.

Sebzelerde kurşuni küf (Domates): Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Tütün çökerten (Fidelerde): Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: TAKCAPTAN® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAKCAPTAN®'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.


TAKCAPTAN®

Islanabilir Toz (WP)

Grup	M4	Fungisit (Mantar ilacı)

% 50 Captan

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 18 Nolu Yolu, No: 1
Büyükdere, KÜLTÜR TURKİYE Tel: 0 388 999 16 06
Fax: 0 388 999 16 19 Niğde V.D.: 388 083 0262
Mersis No: 038808302000001 Tic Sic No: 1100
Ruhşatlıca



29 Mayıs 2023
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.