

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 18.11.2022 / 12573

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Patates	Kırmızı köklü tilkikuyruğu	( <i>Amaranthus retroflexus</i> )
	Sirken	( <i>Chenopodium album</i> )
	Çoban değneği	( <i>Polygonum bellardii</i> )
	Şeytan elması	( <i>Datura stramonium</i> )
	Anadolu şahteresi	( <i>Fumaria kralikii</i> )
	Yoğurt otu	( <i>Galium sylvaticum</i> )
	Kara yonca	( <i>Medicago lupulina</i> )
Sarmaşık çoban değneği	( <i>Polygonum convolvulus</i> )	

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Patates ekiminden sonraki 1 hafta içerisinde, tarlaya sürgü çekiminden hemen sonra, yabancı otlar henüz çıkış yapmadan önceki dönemde uygulanmalıdır.

Toprak herbisitlerinden iyi sonucu alabilmek için, tohum yatağının keseksiz olması ve toprakta yeterli nemin bulunması önemlidir. Kuraklık, su baskını, zararlı yoğunluğu, hastalık şiddeti, don veya yüksek gece gündüz sıcaklık farklılığının bulunduğu dönemlerde **ABURRO® 800 EC** ile uygulama yapmayınız.

### MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Patates ekiminden sonra olası bir olumsuzluk durumunda, 6 ay sonra toprak işleme yapılmadan (direkt ekim) ayçiçeği, mısır, keten, yulaf, arpa, buğday, kanola ve soya fasulyesi ekilebilir. 6 ay sonra toprak işleme yapılarak havuç, marul, şeker pancarı, patates ve yer fıstığı ekilmesi güvenlidir.

### BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında **ABURRO® 800 EC** ruhsatlı olduğu kültür bitkisi tarafından çok iyi derecede tolere edilir. Doğru ekim tekniklerine uygun olarak tohumların tamamını toprak altında kalacak şekilde (en az 3 cm derinlikte) uygulama yapılması ile ürün güvenliği sağlanmış olur. Ekim sonrası oluşan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek yüzey akışlarıyla yabancı ot kontrolünde dışişler yaşanabilir.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**ABURRO® 800 EC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3,15 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ABURRO® 800 EC** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K3,15 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞILIRLIK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım deneylerinin yapılması tavsiye edilir.

Ferbis

FERBİS TARIM TİCARET  
VE SANAYİ A.Ş.

# ABURRO® 800 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	K3,15	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-------	-----------------------------

800 g/l Prosulfocarb

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Göz ile temasında:** 15-20 dakika göz açkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

**Cilt ile temasında:** Elbiseleri çıkarın. Bitki koruma ürünü değmiş vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.

**Solunması halinde:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

**Yutulması halinde:** Hastayı ve bitki koruma ürününün ambalajını derhal doktora gösterin. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

**UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114**

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

18 Kasım 2022

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:  
Prosulfocarb

### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ:

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.  
H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.  
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.  
FNC Tarım blok No:6 Bor/NİĞDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 999 16 19



Ferbis FERBİS TARIM VE SANAYİ A.Ş.  
Organize Sanayi Böl. Mah. 2B Nolu Yol Cad. No:6  
Bor / NİĞDE / TÜRKİYE Tel: 0 388 999 16 06  
Fax: 0 388 999 16 19 Niğde KOD: 388 983 0252  
Mersis No: 038803302500001 T.C. No: 2997