

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 22.04.2010 /7680

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi |
|------------------|--|---|
| Bağ * | Köpekdişi ayrığı Kanyaş (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Köpekdişi ayrığı 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşle iken |
| Domates | Köpekdişi ayrığı Darıcan Kanyaş (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkış sonrası |
| Ayçiçeği | Tilkikuyruğu Brom Köpekdişi ayrığı Darıcan Yabani arpa Yabani darı Çayır püskülü Yapışkan darı Kanyaş (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Bromus spp.</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Hordeum spontaneum</i>) (<i>Panicum spp.</i>) (<i>Poa spp.</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası |
| Soğan | Darıcan Yapışkan darı Kanyaş (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Soğan 15-20 cm boyunda, kanyaş 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda iken |
| Kırmızı mercimek | Tilkikuyruğu Kısr yabani yulaf Kendi gelen arpa Kendi gelen buğday Ayrık (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Bromus vulgaris</i>) (<i>Triticum aestivum</i>) (<i>Elymus repens</i>) | 75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde Çıkış sonrası 100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde Çıkış sonrası |
| Şekerpancarı | Tilkikuyruğu Yabani yulaf Püsküllü çayır Darıcan, (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena fatua</i>) (<i>Bromus tectorum</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) | 75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır. |
| Pamuk | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır. |
| Soya fasulyesi | Tilkikuyruğu Köpekdişi ayrığı Darıcan Kuşyemi Yabani darı Kanyaş (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Phalaris spp.</i>) (<i>Panicum spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede Çıkış sonrası |
| Kanola | Delice (<i>Lolium temulentum</i>) | 200 ml/da Çıkış sonrası 100 ml/da Çıkış sonrası |
| Nohut | Tilkikuyruğu Yabani yulaf Kendi gelen buğday (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena fatua</i>) (<i>Triticum aestivum</i>) | 75 ml/da Çıkış sonrası |

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



FERBİS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.

ABONE® SÜPER 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

| | | |
|-------|-----|-----------------------------|
| Grubu | A,1 | Herbisit (Yabancı ot İlacı) |
|-------|-----|-----------------------------|

50 g/l Quizalofop-p-ethyl

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.
Yutma: Doktor tarafından aksi söylenmedikçe kusturmaya çalışmayın. Zehir danışma merkezini arayın veya doktora başvurun. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.
Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum yavaşlamışsa suni solunum yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Quizalofop-p-ethyl
Aromatik hidrokarbon

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226 Alevlenir sıvı ve buhar
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P280 Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçınınız.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Depoda başka ürünlerle karışmasına mani olunuz.
- Bitki koruma ürününün hazırlanmasında temiz su kullanınız.
- Tohumlarla temas ettirmeyiniz.
- Buğdaygillerle karşı fitotoksiktir.
- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalandırılmakta olan yerlerde muhafaza ediniz.
- Ürünü kendi ambalajında ağız kapalı olarak saklayınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne göre imha ediniz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

28 Eylül 2020

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Genel Müdür Yardımcısı

(Handwritten signature)
TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM
FİRMASI
KURULUŞ BAŞKANLIĞI

REV.1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kıyaf için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ABONE® SÜPER 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ABONE® SÜPER 5 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

**FERBİS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.****ABONE® SÜPER 5 EC**

Emülsiyon Konsantre (EC)

| | | |
|-------|-----|-----------------------------|
| Grubu | A,1 | Herbisit (Yabancı ot İlacı) |
|-------|-----|-----------------------------|

50 g/l Quizalofop-p-ethyl**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NIĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

2 8 Eylül 2020