



Elmada san jose kabuklubitine karşı kış uygulaması olarak ocak-mart ayları arasında gözler uyanmadan uygulama yapılır. Erken ilkbahar mücadelesi olarak pembe tomurcuk döneminde larvalara karşı uygulama yapılır. Yaz mücadelesi olarak çiçekten sonra zararının yavrulama başladıktan sonra ilk uygulama yapılır. Bitki koruma ürününün etki süresi takip edilerek gerekiyorsa ikinci uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Direnç gelişimini geciktirmek için Comment®800 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU:

Comment® 800EC kükürt, captan ve folpet aktif madde bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Şayet söz konusu bitki koruma ürünleri bitkiye uygulanmış ise Comment® uygulaması için 20 gün beklemek gerekmektedir. Comment®800 EC tek başına kullanılmalıdır.

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. COMMENT®800 EC

YAZLIK YAĞ

Grup	-	Insektisit-Akarisit (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
------	---	--

800 g/ L Parafinik Mineral Yağ

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. FNC Tarım
blok No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06 Fax: (0 388) 999 16 19

ÜRETİCİ FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22



**FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**
Organize San. Böl. Mh. 2B Nolu Yol Cd.
No:6 Bor/ NİĞDE Tel:0388 315 00 79
Niğde V.D. 3880830262 Tic.Sic.No:2697

07 -09- 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi: (")

Şarj No: (Damga ile)

Ruhsat tarih ve no.su:

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Hıyar (Sera)	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) (<i>Tetranychus urticae</i>)	800 ml/ 100 L su (larva-nimf-ergin)
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1,5 L /100 L su
Şeftali	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	3 L/100 L su
Elma	San jose kabuklubiti (<i>Diaspidiotus perniciosus</i>)	2,5 L/100 L su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyarda kırmızıörümceklerle karşı yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülme başladığı, sürgünlerin %15'den fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci döle bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.



07-09-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. COMMENT® 800 EC

YAZLIK YAĞ

Grup	-	Insektisit-Akarisit (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
------	---	--

800 g/L Parafinik Mineral Yağ

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK

TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR

ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE

BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU

İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile teması halinde: Göz kapaklarını açık tutarak bol su ile yıkayınız.

Kızarıklık veya ağrı varsa doktora kontrol ettirilmelidir.

Deri ile teması halinde: Bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Kirlenen elbiseyi çıkarıp temas eden cilt yıkanmalıdır. Ciltteki tahriş geçmezse doktora götürülmelidir.

Yutulması halinde: Bol miktarda yutulması durumunda zorla kusturulmadan doktora götürülmelidir.

Solunması halinde: Gaz solunması sonucu burun ve boğazda tahriş veya öksürük varsa etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Belirtiler devam ederse doktora götürülmelidir.

ANTİDÖTÜ: Yutulduğunda zorla kusturmayınız. Spesifik bir panzehir veya terapik uygulamalar yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

© FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A. Ş.'nin tescilli markasıdır.

Net Miktarı (kg veya lt)

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Parafinik Mineral Yağ

ZARARLILIK İŞARETLERİ:

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

Sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Comment®800 5°C' nin altında ve 32°C üstündeki sıcaklıklarda uygulanması tavsiye edilmez. Isı kontrolü gölgede yapılmalıdır.
- İlaçlama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye edilir.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Jrgağı San. Böl. Mh. ZB Notu Yol Cd.
No:61 / Niğde Tel:0388 315 00 79
Niğde V.D. 3880830262 Tic.Sic.No:2697