İmal Tarihi : (Baski veya damga ile ay ve yil olarak)
Son kullanma tarihi. (")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve nosu: **30.04.2004/ 4658**

KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR

Bitki Adi	Zararli Organizma Adi	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasindaki süre
Bugday	Sürme *(Tilletia spp.)*	150 g/100 kg tohum	-
	Rastik *(Ustilago nuda var. tritici)*	150 g/100 kg tohum	-
Arpa	Kapali rastik *(Ustilago hordei)*	150 g/100 kg tohum	-
	Açik rastik *(Ustilago nuda f.sp. hordei)*	150 g/100 kg tohum	-
	Çizgi yaprak lekesi *(Pyrenophora graminea)*	150 g/100 kg tohum	-

BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tohum uygulama islemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalisan tohum uygulama makinesi ile yapilabilir. Uygun ekipman bulunmamasi durumunda, tohumlar düz bir zemine yayilarak homojen bir kaplama saglanacak sekilde uygulama yapilir. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçli tohum ile mibzer ayarinin tekrar yapilmasi tavsiye edilir. Kullandiktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKLI:
Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapilacak ise, 100 kg tohum için önerilen 150 g ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir sekilde karistirildiktan sonra yavas yavas birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasinda uygulama varili çevirilerek tohumlarin homojen olarak iyi bir sekilde kaplanmasi saglanir.

Uygulama tertibati olan selektörlerde ise, ön deneme yapilarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktari tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktaridir. Bu husus saglandiktan sonra gerekli miktar su ile iyice karistirilir ve uygulama tertibati deposuna konularak uygulama yapilir. Çimlenme kapasitesi düsük, soyulmus veya çatlamis, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayiniz. Tohum uygulama ekipmanlari çok soguk (0°C alti) sicakliklarda problem olusturabilir. **WHEATMASTER® DS 2** 0°C üzerindeki sicakliklarda uygulanmalidir.

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI: Wheatmaster® DS 2 adli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasina göre Grup G1:3 olarak siniflandirilmis bir fungisittir. Ayni etki mekanizmasina sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalari, direnç gelisimini tesvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelisimini geciktirmek için **WHEATMASTER® DS 2**'nin ayni üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayisini asmayiniz. Uygulamanin tekrarlanmasi gerektigi durumlarda ise, farkli etki mekanizmasina sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanilmasina özen gösteriniz.

KARISABILIRLIK DURUMU: Tohumla geçen hastaliklarin kontrolü için diger bir bitki koruma ürünü ile karistirilmasina gerek yoktur.

22 Ocak 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ferbis **FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S.**

WHEATMASTER® DS 2

Toz (Kuru tohum ilaci)

Grup	G1:3	Fungisit (Mantar ilaci)

%2 Tebuconazole

ÖNCE ETIKETI OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK TUTUNUZ.
BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBIRSEY YEMEYINIZ, IÇMEYINIZ. SIGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RISKLERI ÖNLEMEK IÇIN TAVSIYE EDILDIGI SEKILDE VE TAVSIYE EDILEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DISINDA KULLANILMASI KESINLIKLE YASAKTIR.

ZEHIRLENME BELIRTILERI:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açikken bol su ile yikayin. Doktora basvurulmalidir.
Cilt: Temas halinde elbiselerini çikarin. Ilaç degen vücut kisimlarini 15–20 dakika bol su ve sabun ile yikayin. Doktora basvurulmalidir.
Yutma: Doktora basvurulmalidir. Bilinci kapali hastaya kesinlikle agizdan bir sey verilmez ve kusturulmaz.
Soluma: Etkilenen kisi temiz havaya tasinmalidir. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptirin. Doktora basvurulmalidir.

ANTIDOTU VE TEDAVISI:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanir.

® FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S. firmasinin tescilli markasidir.

UZEM (Ulusal Zehir Danisma Merkezi) Tel: 114

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osman ARI
Daire Başkan V.

Net Miktari (kg veya lt)
Brüt agirlik (kg)
Azami perakende satis fiyati: Baski

İÇİNDEKİLER: Tebuconazole

ZARARLILIK ISARETLERI:

DIKKAT
ZARARLILIK IFADELERI (H):
H302 Yutulmasi halinde zararlidir.

ÖNLEM IFADELERI (P):
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanin.
P261Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaçinin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçinin.
P501 Içerigi/kabi ilgili yönetmelikler dogrultusunda bertaraf edin.
EUH401 Insan sagligina ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarina uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
-Baliklara zehirlidir. Sulara bulastirmayiniz.
-Arilara zehirlidir. Çiçeklenme zamani kullanmayiniz.
-İlaçli tohumlari gida ve hayvan yemi olarak kullanmayiniz.
-İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) sartlarda orijinal ambalajinda açilmadan depolandiginda 4 yil süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hosgörü (tolerans) sinirlari disinda bir degisiklik olmaz.

FIRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarinda satilmak kaydi ile imalatçilar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatali depolanmasi veya hatali tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHIBI VE ÜRETICI FIRMA:
FERBIS TARIM TICARET VE SANAYI A.S.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NIGDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

YERLİ ÜRETİM

Ferbis FERBIS TARIM TIC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2 B Nolu Yol Cad. No:6
Bor / NİĞDE Tel: 0 388 999 16 06
Fax: 0 388 315 00 89 Gsm: 0 (388) 083 0262
Mersis No: 0482008402620001
SELİM ERİŞ
Ruhsatlandırma Sorumlusu